

LES VOIES DE LA CONTAMINATION

Réponse immunitaire de l'organisme – Chapitre 1 – 3^e

► Compléter ce tableau à l'aide des données du document 2 (page du site SVT, chapitre 1, séquence 3).
 Pour chaque exemple : - 1^{ère} ligne, l'agent infectieux et la maladie - 2^e ligne, le mode de contamination – 3^e ligne, la prévention d'une contamination.

AGENTS INFECTIEUX	VOIE	
Les virus de la grippe « Le virus de la grippe se transmet dans l'air à travers les fines gouttelettes projetées par les personnes contaminées (toux, éternuement, ou lors d'un contact direct (poignée de main, baiser). » Hygiène des mains (se laver les mains plusieurs fois par jour), porter si nécessaire un masque, aérer la pièce, jeter les mouchoirs dans un sachet fermé. La vaccination chaque année permet d'éviter le développement de la maladie.	Voies respiratoires	
Les bactéries Salmonelles responsables de la salmonellose (gastro-entérite avec fièvre et diarrhée). Elles sont présentes dans le tube digestif des animaux (bovins, ovins, porcs et poulets) et des humains contaminés. Via un aliment (lait donc fromage, viande, peau des poulets ou œufs) contaminé par la bactérie. Via d'autres humains eux-mêmes contaminés. Hygiène des mains, bien cuire les aliments (à 65°C durant 5 à 6 minutes) et conserver les œufs dans le réfrigérateur.	Voies digestives	
Les champignons microscopiques (levures et moisissures) sont responsables des mycoses qui se développent principalement dans les replis de la peau et les ongles, mais peut atteindre les muqueuses (bouche par exemple). Le contact avec une personne ou un animal, un linge infectés, l'eau de piscine Se laver correctement tout le corps y compris le nombril, les oreilles, l'entre-jambe, les doigts de pieds	Voie cutanée	
Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) responsable du Sida (syndrome d'immunodéficience acquise). Il s'attaque aux défenses immunitaires (lymphocytes T4). On décède d'une infection bénigne contre laquelle on ne peut plus se défendre. Rapport sexuel Protection (préservatif masculin) lors d'un rapport sexuel avec un partenaire occasionnel (qui ne vous a pas montré la preuve de sa séronégativité et en qui vous n'avez pas totale confiance).	Voies génitales	
Bilan – Quelle est la stratégie de contamination ? La contamination se fait par les surfaces en contact avec le milieu extérieur : la peau et les muqueuses qui recouvrent les voies internes du corps.		